

Rapport de différentes observations communiquées
à l'Académie par M^r. Philippe Chirurgien à Chartre

Des différentes observations dont l'Académie m'a chargée de lui rendre compte, la ière a pour objet une fracture du col du fémur occasionnée par une chute dessus le grand trochanter que fit une demoiselle âgée de 32 ans, dont la guérison a été opérée sans le secours d'aucune espèce de bandage ni appareil quelconque et sans autre manœuvre de la part du Chirurgien qui a suivi cette maladie, que celle de réduire le membre fracturé qui étoit de 4 travers de doigt plus court que l'autre et dont la pointe du pied étoit tournée en dehors ainsi que le genou qui étoit aussi légèrement fléchi, sans autre manœuvre dis-je que celle de remettre le membre fracturé dans sa longueur et sa situation naturelle et le soutenir dans cette position avec des oreillers qui appuioient sur les parties latérales et internes. manœuvre que le Chirurgien a été obligé dans les commencemens de réitérer matin et soir, parce que le dérangement qu'occasionnoit la contraction des muscles de cette partie étoit considérable, mais à peine la ière semaine fut-elle écoulée qu'elle commença à devenir moindre et qu'elle diminua en bien de jours en jours au point de ne presque point laisser appercevoir de dérangement, si l'on en excepte la pointe du pied qui étoit toujours un peu tournée en dehors et qui est restée telle même après la guérison que l'on

a l'ouïtre par bâte après trois mois et demi de l'ette
simple l'onduite, puisqu'on permet pour lors à la malade
de se lever et d'élayer quelques jours après de mettre le
pied a terre a l'aide de deux bequilles, le qu'elle bit avec allé
de succès, puisqu'elle parvient ainsi peu a peu a l'aide de le
moyen, a se promener dans la chambre. mais pour lors la
jambe malade qui jusque-la avoit été par batement égale
a l'autre s'est insensiblement racourcie jusqu'à la concurrence
d'un bon ponce, le que son chirurgien n'a attribué qu'à la
mollesse de la matiere du cal qu'il soupçonnoit n'avoir point
encore acquis allé de consistence pour résister au poids du
corps, le qu'il croit qu'un plus long séjour du lit auroit pu
procurer. le qui paroîtroit allé vraisemblable en supposant
avec luy que la reunion des piéces fracturées ait eu lieu
comme il le croit au moyen de la matiere du cal, et qu'elle ne
se soit pas bâte comme je le presume de la meme maniere
de celle que l'on a observé plusieurs fois après de semblables
fractures, lesquelles pour avoir été mal contenues ou pour
ne l'avoir point été comme celle cy, ne se sont reunies qu'au
moyen d'une substance ligamenteuse ressemblante en
quelque sorte a celle des capsules articulaires. espere de
l'observation que je crois d'autant plus probable dans le bâte en
question, qu'il me paroît impossible si tans est qu'il s'en soit
bâte une, qu'elle ait pu se faire autrement, parceque
cette fracture n'ayant jamais été contenue par aucun
moyen, a du par la grande proximité avec le tronc être

nécessairement exposée à tous les mouvements auxquels la
dernier me paroit avoir été indispensablement assujettie
toute les fois que la malade a été dans le cas de satisfaire
à ses différents besoins naturels, le qui a dû continuellement se
répéter pendant toute la lueur plusieurs fois le jour et la
nuit, et s'opposer conséquemment à la formation de la matière
du cal, qui ne peut s'opérer que par le plus grand repos. J'ou
s'interesse que cette observation loing de favoriser la proscription
générale de toute espèce de bandage ou appareil quelconque
dans le traitement des fractures simples comme l'auteur
paroit vouloir en conclure, l'am en excepter même les bandes
recommandés par M^r Foubert avec lesquels il prétend qu'il
n'auroit point aussi bien réussi; elle ne peut au contraire que
les rendre plus recommandables et surtout les derniers, parcequ'ils
est à presumer d'après les succès multiples dont leurs applications
a été suivies, que si ils eussent été employés pour le traitement
de la fracture en question, il est à presumer dis-je d'après le
peu d'accident dont elle a été accompagnée que le succès qui
auroit pu en résulter, auroit été plus complet par l'intime
et solide cohésion qu'elle auroit pu procurer entre les pièces
offensées, le que je ne crois pas qui ait pu arriver d'après
le peu d'abandon qui en a été fait.

quoy qu'il en soit de cette observation, elle pourroit devenir fort
intéressante par les conséquences pratiques que l'on pourroit en
deduire si l'on n'avoit positivement à quoy s'en tenir sur le
mécanisme que la nature a employé pour opérer cette
espèce de guérison, le que l'on pourroit peut être avoir en



ecrivant à l'observateur d'écrire le moment de la mort de
cette demoiselle et le prier de faire en sorte d'obtenir
des parents l'ouverture du cadavre et l'enlèvement
même de la pièce d'après laquelle l'académie sera plus
apportée de juger si l'abandon que le chirurgien propose
doit être admis ou rejeté.

2^{me} obl.

il est question dans la 2^{me} observ. d'une fracture à la
partie intérieure de la jambe, compliquée de plaie et
de fracas si considérable, que plusieurs pièces du fémur
furent enlevées, dont une entre autre formoit une
assez grande portion de tout le cylindre, dont la guérison
n'a cependant été suivie d'aucun raccourcissement du
membre au moyen de la boîte ordinaire aux fractures
à l'extrémité de laquelle le chirurgien observateur avoit
adapté une machine extensive à l'instar de celle de M^r
Coutavos, et qui ne diffère de cette dernière que par ce que
le cylindre est attaché à la boîte même comme on peut
le voir par la figure qu'il en a donné. Cette observation
dont les détails trop longs pour les rapporter sont
intéressants, fait voir les ressources de la nature dans
les cas même les plus désespérés, surtout lorsqu'elles sont
dirigées avec autant d'art et d'intelligence que le chirurgien
en a fait paroître dans la conduite qu'il a tenue pour
obtenir la guérison de cette maladie grave. Cette

observation quoique fort analogue a celle de Mr Loutavos
n'en merite pas moins d'être conservée.

3^{me} article.

Le même Chirurgien propose en 3^{me} Lieu une machine
pour fixer invariablement une pièce d'os quelconque qu'il
seroit nécessaire de retrancher avec la tige a un membre que
l'on voudroit conserver, et dont la portion d'os n'auroit point
allé de prise pour être solidement alligettée avec les doigts.
Cette machine est composée d'une pièce montante fixée
perpendiculairement sur un pied horizontal solide. Cette
pièce montante est faite de deux morceaux de bois égaux
l'un a l'autre dans toutes leurs dimensions, une seule de les
deux pièces est jointe par un fort tenon et une mortaise
au morceau qui sert de base, et a quelques pouces au dessus
de cette base, elle porte une avance double qui reçoit l'avance
simple de l'autre pièce parallèle, au moyen de cette avance,
les deux pièces se trouvent articulées a la manière des deux
pièces qui forment le pied de roy. elles peuvent de même
s'écarter l'une de l'autre par le haut; a la partie supérieure
de les deux pièces se trouve une échancrure qui doit former
la bourse en se réunissant. a quelques pouces au dessus de
ces échancrures, se trouve dans chaque pièce une autre
échancrure qui doit former la mortaise d'un trou rond, dont
le diamètre soit égal a celui de la tige qu'il doit admettre,
mais dont l'axe doit être un peu incliné du côté qui regarde
le malade. Dans la base latérale du montant est un trou



traverse percée à peu près dans le milieu de l'intervalle qui se trouve entre les deux échancrures qui forment la bouche et le trou destiné à recevoir la tige. le trou qui traverse les deux pièces du montant admet une vis destinée à les approcher mutuellement et à les serrer fortement l'une contre l'autre de manière à assujettir invariablement la troisième pièce qu'il nomme la tige, et qui n'est autre chose qu'un bâton fendu en forme de pince et dont les mors sont amincis de façon à être proportionnés au volume de la pièce d'où ils doivent saisir et qu'ils assujettissent au moyen d'une virole de fer fixée par une vis.

Cette machine que l'auteur a voulu rendre commune par son échancrure supérieure à celle que M^r Portland a imaginé pour la résection de l'os de la cuisse après l'amputation, me paroît non seulement trop compliquée pour en rendre l'usage commode et familier, mais elle me paroît encore essentiellement defective en ce que la tige qui est la seule pièce nécessaire de toute cette machine, est faite de bois, ce qui doit être plus que suffisant pour la faire rejeter, parce que cette matière en la supposant comme le chirurgien le demande d'une texture assez tendre, pour que l'os y ^{faile} son impression, ne pourroit point avoir assez de solidité pour la tenir fermement, sur tout en la proportionnant comme il le dit au volume de la pièce d'où qui seroit à retrancher, et si on la faisoit d'un bois plus dur et plus compact, le fragment d'os n'y feroit plus son impression

et pourroit vaciller, le qui deviendroient un inconvenient pire que le premier. J'ouïs donc que cette machine ne peut être adoptée telle qu'elle est, à moins que l'on ne lui substituât une tige de fer, ou une espèce de pince. Dans les mors seroient d'acier allié trempée pour que les dents dont ils seroient armés, puissent s'imprimer dans la pièce d'os, le que l'on obtiendrait par le moyen d'une vis qui traverseroit les mors et que l'on seroit à volonté par le moyen d'un cerceau ailé. Cette seule pièce qui comme je l'ai déjà dit est la seule nécessaire, seroit suffisante pour rendre praticable la section susdite, sans avoir l'inconvenient qu'auroit tout l'ensemble de la machine avec laquelle on n'opéreroit aussi commodément ni aussi sûrement qu'avec le simple instrument que je propose.

4^{me} obs.

La 4^{me} concerne une fistule lacrimale qui avoit été opérée deux fois infructueusement et à la troisième opération de laquelle l'os unguis fut trouvé en la perforant être de deux lignes d'épaisseur. Cette singularité si rare est qu'elle soit réelle en supposant que le chirurgien ne se soit pas trompé en prenant l'apophyse nasale de l'os maxillaire pour l'os unguis, le que l'on ne peut raisonnablement presumer d'après les recherches exactes qu'il paroit avoir fait pour ne pas s'y méprendre. Cette singularité dis-je que l'on ne pourroit pour lors attribuer qu'à une exostose bénigne comme le fait le chirurgien, me paroit d'autant plus remarquable que je crois qu'elle n'a jamais été observée.



5^{me} obs.

Le meme observateur rapporte dans la 5^{me} un fait concernant la reduction d'une hernie avec stranglement par un moyen jusque la inusité, qui luy a été communiqué par M^r l'heureux medecin a noient le retrou. le medecin ayant été mandé dans le courant d'avril de l'année 1765 pour un homme âgé de 45 ans qui depuis dix ou douze ans portoit une hernie inguinale qui portoit et rentroit alternativement tous les jours lorsqu'il étoit debout ou couché, a laquelle il survint un stranglement si considérable, qu'aucun des moyens usités en pareil cas, ne put en procurer la reduction. n'étant apporté d'aucun chirurgien qui fut en état d'en faire l'opération que le medecin regardoit comme urgente, et ne pouvant la faire luy meme, il imagina un moyen qui put y suppléer et fit mettre pour cet effet le malade dans un demi bain d'eau si chaude que la main avoit de la peine a la supporter et cela dans l'intention de rarefier l'air contenu dans le paquet d'intestins qui formoient l'anneau, dont le volume ne pouvoit augmenter sans occasionner la dilatation de l'anneau. cette augmentation de volume ayant eu lieu comme il l'avoit prévu, il fit pour lors coucher son malade qu'à une heure et demie d'un bain si chaud avoit fait trouver mal, et appliqua sur la hernie seulement des linges trempés dans l'eau froide afin de condenser l'air que la grande chaleur avoit rarefié.

le qu'il repetta trois fois en un quart d'heure avec tant de succès, que la réduction se fit complètement et avec affe'de facilité par la grande diminution que le repercuflit avoit procuré à la tumeur dont le volume étoit d'un grand tiers moindre. Des l'instant le malade fut guéri et ne s'occupa plus qu'à reparer les forces que 3 saignées, les vomitemens continels et la douleur Luy avoient fait perdre pendant pres de ling jours qu'avoit duré la torture. quoy qu'il en soit du succès qu'a obtenu M^r L'heureux par le moyen je ne crois pas avec le redacteur de cette observation que l'on puisse indistinctement l'employer dans tous les cas. Dans toutes les hernies recentes par exemple dans lesquelles l'étranglement est inflammatoire, il seroit à craindre que la raréfaction qu'occasioneroit la grande chaleur n'augmenta l'inflammation, et qu'elle n'accéléra par conséquent la putréfaction des parties étranglées, qui ne sont déjà que trop disposées à tomber en gangrene. au reste le ne peut être qu'à l'expérience à prononcer de la valeur de le moyen, et à luy assigner les cas ou il pourroit être nuisible ou salutaire.



6^{me}

Il est question dans la 6^{me} qui est encore de M^r L'heureux de l'extraction d'un corps étranger hors de l'œil par un moyen bien simple, voici le fait. un passant en passant une haie fut trappé au visage par une branche de pêne dont une des pointes qui étoit peche s'enfonça jusqu'à la base au travers de la

cornée transparente et se rompit aussitôt de façon à ne
laisser aucune prise pour pouvoir la retirer, les accidens
que le corps étranger occasionna pendant les huit jours qu'il
séjourna dans cette partie décidèrent le blessé à s'adresser à
des sçavans qui ne trouvant point de prise pour la retirer,
parcequ'il étoit cassé au niveau de la cornée, prit un morceau
de poix noire au quel il donna la forme d'une petite bougie,
dont il fit chauffer le bout et l'appliqua sur le centre de la
base de cette epine après l'avoir préalablement desséchée en
en absorbant toute l'humidité avec un linge, et dès que la
poix fut assés refroidie pour adherer a le corps, il le retira
aussitôt sans éprouver la plus petite difficulté; Les accidens
cessèrent par cette extraction qui toute simple qu'elle paraisse
n'en est pas moins ingénieuse, et n'en a par conséquent pas
moins son mérite.

7^{me}

La 7^{me} a pour objet l'ouverture du cadavre d'un homme âgé de
48 ans, qui pendant les sept mois qu'a duré sa maladie s'étoit
toujours plaint d'une violente douleur dans le centre de l'os des
îles du côté gauche qui répondoit à l'os sacrum en s'étendant
jusqu'à la région lombaire du même côté sans que l'on y ait
jamais remarqué la moindre apparence de tumeur, raison
pour laquelle le malade qui étoit medecin prit cette douleur
pour une siatique pour laquelle il fit des remèdes sans en
retirer le moindre fruit, puis que cette maladie le conduisit
au tombeau. a l'ouverture de son cadavre on apperçut une

Liquor jaunâtre et sanieuse qui tram su doient au travers
des parties charnues qui recouroient l'os des iles. l'os étoit
tout à fait mis à nud, on vit une fracture Longitudinale —
éloignée d'environ trois travers de doigt de la Symphise sacro
iliaque et qui luy étoit parallèle. Les bords de cette fracture
ne laissoient guere moins de deux ou trois lignes d'intervalle
entre eux, la plus grande partie de la substance spongieuse
de l'os étoit entièrement détruite, de façon qu'il ne restoit que
les deux lames qui étoient percées en plusieurs endroits, et pour
voir jusqu'où alloit le ravage qu'avoit fait cette lésion, on
fit l'os dans une direction presque parallèle à la fracture,
ce qui divisa la cavité cotiloïde en deux, on trouva un foyer
plus long que large qui avoit détruit toute la substance
osseuse qui forme la paroi supérieure de cette cavité dont
il ne restoit d'intact que le cartilage qui la revet intérieurement.
Le foyer paralent étoit d'une capacité à pouvoir contenir une
noix ordinaire et contenoit une matière sanieuse grisâtre dont
l'odeur n'étoit pas fort sensible. l'os étoit augmenté de —
volume dans toutes les dimensions, mais surtout en épaisseur,
l'intérieur de l'articulation et le fémur étoit sains.

Le rédacteur de cette observation cherchant à développer la cause
de cette lésion, dit que le malade n'ayant jamais eu de symptôme
qui ait pu faire soupçonner aucun vice particulier tel que le
verruen, le scorbut ou le scorbutique et que n'ayant
jamais reçu de coup, ni fait de chute sur cette partie, qu'il ne soit
point étonnant que la suppuration de l'os fut due à l'usage —
indiscret que le malade a fait du kinkina pour se débarrasser



D'une fièvre quarte à laquelle il étoit sujet, et que le remède dont il prenoit de très grandes doses, ayant plutôt supprimé que guéri cette fièvre, il peut être résulté de cette suppression une métastase de la matière fébrile qui en se déposant sur les des îles, peut y avoir occasionné par son développement tout le ravage susdit, quoiqu'en cela cet observateur parvienne au sentiment de quelques auteurs tels que Baglivi, et Musler juncos et autre qui disent que le Binbina en supprimant la fièvre quarte engendre souvent des maladies plus dangereuses, comme sont l'Hydropisie, la fièvre lente, la phthisie, l'obstruction & je crois qu'assez souvent c'est moins au Binbina qu'il faut s'en prendre, si les maladies chroniques arrivent après l'usage de ce remède, qu'à la cause originale de cette fièvre, dont elle n'est souvent que le symptôme, c'est à dire que cette fièvre n'étant entretenue souvent que par un vice vénérien auquel le Binbina ne peut remédier, il n'est point étonnant qu'elle dégénère en maladie chronique dont l'issue est toujours fâcheuse. C'est aussi le qui pourroit bien être arrivé au malade dont il est question, qui pour n'avoir peut être jamais eu de symptômes bien décidément vénériens, a cru pour cette raison pouvoir être à la brui de tout soupçon à cet égard, et n'aura par conséquent pas cru devoir s'arrêter à une cause qui étoit peut être la seule qui ait donné lieu à cette maladie. Cette conjecture me paroit d'autant plus probable qu'elle n'est point sans exemple. Cette observation sur laquelle on ne peut qu'hésiter, ne me paroit pas cette

raison, ne pouvoir être d'aucune utilité

Et 9^{me}

il est question dans la 9^{me} obl. d'un homme âgé de 48 ans auquel on extirpa une tumeur carcinomateuse à la partie supérieure et presque interne de la cuisse, sans rien emporter des tegumens qui la recouroient, afin d'accélérer la guérison, qui ne fut pas plutôt terminée, que le vice cancéreux qui l'avoit produite, se manifesta de nouveau par la reproduction d'une nouvelle tumeur qui occupoit toute l'étendue de la cicatrice qui avoit au moins quatre pouces de long sur un d'hauteur. Le second carcinome dont la prompte reproduction ne fut attribuée par le Chirurgien qui avoit opéré le malade qu'à la conservation de la peau qui recouroit la 1^{re} tumeur, et qu'il n'avoit ménagée que par condescendance pour le Chirurgien qui avoit précédé son opération. Le second carcinome dis-je fut attaqué avec la pierre à cautère d'après le conseil d'un célèbre Chirurgien de Paris que l'on avoit consulté. Le cautère dont l'application ne fut point ménagée à l'effet de mortifier en une seule fois toute l'épaisseur de la tumeur, n'empêcha cependant point qu'il ne se fit aussitôt après la chute de son encas des végétations qui ne purent être réprimées, le qui décida le Chirurgien à proposer à tous les consultants une troisième extirpation par l'instrument tranchant, le qui fut exécuté aussi cruellement qu'inutilement, puis qu'après avoir incisé les



teguement des environs, la plus grande partie de la —
tumeur fut arrachée avec les doigts ^{et les ongles} que le Chirurgien
avoit laissés croître exprès. mais comme cette masse
cancéreuse étoit adhérente aux muscles de l'aille
dans l'interstice desquels elle pénétrait très profondément
et qu'elle adhéroit à la murale, il fut obligé d'en laisser
une partie, qui produisit au Mitot de nouvelles végétations
qui rendirent cette bruelle opération d'autant plus —
infructueuse que le malade n'y survécut que dix jours, après
lesquels on fit l'ouverture de son cadavre, dans lequel on
trouva tout le tissu cellulaire et les muscles de l'aille ne
formant qu'une seule masse adhérente au tumeur.

Le Chirurgien finit par dire dans la même dernière observation
au sujet du même malade, qu'il avoit traité peu de temps
auparavant l'apparition de la première tumeur de l'aille,
d'un petit tubercule fongueux qui avoit paru spontanément
à la peau qui recouvre le pied au dessus des os du métatarsus,
et que le tubercule s'étoit manifesté successivement à trois
reprises différentes dans le cours des trois années qui ont
précédé le cancer de l'aille, et que chaque fois que cette
petite tumeur a paru, on n'a pu la réprimer que par le
caustique, qui l'on a été obligé de répéter quatre fois par
chaque traitement. La recrudescence de tous les tubercules
joint à la difficulté que le Chirurgien éprouva pour les
réprimer, auroient bien dû lui faire ouvrir les yeux

~~22. 1770~~ par le caractère de tumeur de l'ulcère
qu'il avoit à traiter, après la première opération de laquelle
il auroit dû en rester la, en se tenant simplement à une cure
palliative au moyen de laquelle il n'eût point abrégé l'homme
il l'a fait les jours de son malade, en appliquant un caustique
que le vice cancéreux l'ontre indiquoit absolument.

quant à la conservation des tegumens qu'il se reproche d'avoir
conservés hors de la 1^{re} opération, et à laquelle il attribue
la reproduction de le carcinome, je conviens avec Luy que
Lorsqu'ils sont vicieux, le que l'on reconnoit par leurs adhérences
avec les parties subjacentes, ou par leur changement de
couleur, il ne faut point pour lors les ménager, ~~mais~~ ce sont
la les seuls cas qui exigent leurs pertes pour une maladie
dont le vice n'est que local, mais lorsqu'il est dû à
l'infestation des humeurs, on auroit bien les emporter, la
récidive n'en arriveroit pas moins.

quoiqu'il en soit de la conduite de l'illustre observateur dans le
traitement de cette dernière maladie qui n'est point exempt
de reproche, on ne doit pas moins Luy savoir bon gré
de son zèle à communiquer à l'Académie tous les faits
qui Luy en paraissent dignes de remarque.

à Paris le 20 de jbre 1770 M. J. A. B.



